

Bleiben Sie geschützt!


Mit Ihrer Entscheidung zur Corona-Schutzimpfung leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutz Ihrer eigenen Gesundheit und zum Schutz Ihrer Mitmenschen. Lassen Sie sich wie empfohlen impfen, um geschützt zu bleiben.

- Der **Impfschutz nimmt mit der Zeit ab** – Bei älteren Personen oder Menschen mit Vorerkrankungen stärker.
- Allen Geimpften wird eine weitere **Impfung** mit einem **mRNA-Impfstoff** empfohlen.
- Besonders in der kalten Jahreszeit nehmen COVID-19-Erkrankungen zu. Das **Risiko für neue Virusvarianten steigt**.
- Die Corona-Schutzimpfung schützt wirksam. Sprechen Sie mit anderen über Ihre Erfahrungen und begleiten Sie sie zur Impfung!

Wichtig zu wissen:

Daten aus anderen Ländern zeigen, dass Infektionen, Impfdurchbrüche und daraus folgende Krankenhausaufenthalte durch die empfohlene 3. Impfung deutlich reduziert werden.

oesterreich-impft.at/jetzt-impfen

 Bundesministerium
Soziales, Gesundheit, Pflege
und Konsumentenschutz

Jetzt impfen!

Informieren Sie sich ausführlich über die Impfung bei Ihrer Ärztin bzw. Ihrem Arzt oder in Ihrer Apotheke. Anmeldung unter:
oesterreich-impft.at/jetzt-impfen



Weitere Informationen unter
sozialministerium.at/corona-schutzimpfung



Impressum

Medieninhaber:in und Herausgeber:in:
Bundesministerium für Soziales, Gesundheit,
Pflege und Konsumentenschutz (BMSGPK)
Stubenring 1, 1010 Wien
+43 1 711 00-0
Verlags- und Herstellungsort: Wien
Titelbild: © Initiative Österreich impft.
Layout & Druck: BMSGPK
November 2021
Vorbehaltlich allfälliger Irrtümer, Druck- und Satzfehler.
Alle Rechte vorbehalten.

sozialministerium.at

 Initiative
**Österreich
impft.**

**Corona-Schutzimpfung:
Wann lasse ich mich wieder
impfen? („3. Impfung“)**
Die Impfung wirkt!



Lassen Sie sich wieder impfen!

- Personen, die **1 Mal mit dem COVID-19 Vaccine Janssen („Johnson&Johnson“)** geimpft wurden, wird eine **weitere Impfung ab 4 Wochen** nach der 1. Impfung empfohlen.
- Bei allen **Personen ab 18 Jahren** kann eine **3. Impfung ab 4 Monaten** und soll **ab 6 Monaten nach der 2. Impfung** erfolgen. Sie ist besonders wichtig für Personen **höheren Alters** sowie für Personen mit **Vorerkrankungen** oder erhöhtem **Ansteckungsrisiko**.
- Bei **Vektorimpfstoffen** (Vaxzevria von Astra-Zeneca & COVID-19 Vaccine Janssen) ist die **3. Impfung 4 Monate nach der 2. Impfung empfohlen, bei mRNA-Impfstoffen möglich**.
- Auch für **Genesene** sind **weitere Impfungen empfohlen**. Sprechen Sie bitte mit Ihrer Ärztin oder Ihrem Arzt!

Wichtig zu wissen:

Die Impfeempfehlungen werden laufend wissenschaftlichen Erkenntnissen angepasst und können sich ändern. Informieren Sie sich bei Ihrer Ärztin oder Ihrem Arzt über aktuelle Empfehlungen und Ihren Impfstatus!

Halten Sie Empfehlungen ein!

Das Nationale Impfgremium (NIG) empfiehlt allen geimpften Personen ab 18 Jahren eine weitere Impfung mit einem mRNA-Impfstoff. Die Impfung kann ab 4 und soll nach 6 Monaten erfolgen.

- Für die 3. Impfung soll bevorzugt derselbe Impfstoff verwendet werden wie für die ersten beiden Impfungen: **Comirnaty von BioNTech/Pfizer** oder **Spikevax von Moderna** (Moderna erst ab 30 Jahren).
- Mit **Vektorimpfstoffen** geimpfte Personen sollen **als 3. Impfung einen mRNA-Impfstoff** erhalten. Dies gilt auch für **Kreuzimpfungen** (mit unterschiedlichen Impfstoffen geimpft).
- Für Personen, die **geimpft und genesen** sind, gelten unterschiedliche Empfehlungen. Sprechen Sie bitte mit Ihrer Ärztin oder Ihrem Arzt!

Wichtig zu wissen:

Viele Menschen können so bestmöglich geschützt werden, um das Risiko einer schweren COVID-19-Erkrankung zu reduzieren. Eine Off-Label-Anwendung (Impfung außerhalb der Zulassung) ist möglich. Voraussetzung ist eine gute Aufklärung und Dokumentation durch Ihre Ärztin oder Ihren Arzt.

Keine Chance für Fake News!

Sie haben sicher schon viele Gerüchte über die Corona-Schutzimpfung gehört. Lassen Sie sich nicht verunsichern. Informieren Sie sich und klären Sie andere auf!

- **Die Corona-Schutzimpfung wirkt.** Das Risiko, schwer zu erkranken oder zu versterben, wird **deutlich reduziert**. Kommt es in Ausnahmefällen trotz Impfung zu einer COVID-19-Erkrankung, so verläuft diese im Normalfall **wesentlich milder**.
- **Das Coronavirus verursacht gefährliche Erkrankungen, die Impfung schützt.** Es müssen nachweislich mehr ungeimpfte Menschen aufgrund einer COVID-19-Erkrankung im Krankenhaus behandelt werden als aufgrund von Impfkomplicationen.
- **Mit der Corona-Schutzimpfung schützen Sie sich und alle, die Ihnen nahestehen.**

Wichtig zu wissen:

Viele Menschen sind von Langzeitfolgen nach COVID-19 betroffen. Die Impfung schützt vor COVID-19 und möglichen Langzeitfolgen. Je weniger Menschen an COVID-19 erkranken, desto weniger wird unser Gesundheitssystem belastet. Jede Impfung zählt!